

スミル[®]ローション3%の使い方

使用法

- 痛いところとその周りにぬってください。
- スポンジを軽く肌に押しつけるようにぬってください。
- 1日数回(3~4回)ぬってください。

(使用量、使用回数は医師とご相談のうえで使用ください。)

※ 裏面に記載の「注意」をよくご覧ください。



このような症状のときにめってください。(例)

正面

背面

肩関節周囲炎
(五十肩)

筋肉痛

上腕骨上顆炎
(テニス肘など)

筋肉痛

腱・腱鞘炎

筋肉痛

変形性関節症
(膝関節症)

 の部位と
その周辺にめってください。

肩関節周囲炎
(五十肩)
筋肉痛

上腕骨上顆炎
(テニス肘など)

筋肉痛

腱・腱鞘炎

筋肉痛
(筋・筋膜性腰痛症)

筋肉痛

腱周囲炎

外傷後の腫脹、疼痛
(足くびの捻挫など)

注意

- 眼や粘膜面、また傷口には使用しないでください。
(液剤をぬった手で眼、粘膜面や傷口にさわらないように注意をしてください。)
- この液剤をぬったあとラップ、ガーゼや包帯で密封しないでください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 直射日光の当たらない涼しい所に、キャップをきちんとして保管してください。
- 火気に近づけないでください。
- 化繊、絹、皮革、アクセサリ等に付着すると変質することがあるので注意してください。
- **使用中に、皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。**