

フェルビナク外用ポンプスプレー3%「三笠」

を使用される患者さんへ

このスプレーは炎症に伴うはれや痛みを和らげるお薬です。

初めて使用する際

真つすぐに立てて4~6回程度
空噴霧した後に使用してください。


使い方

- 医師の指示に従い1日
3~4回患部に噴霧
してください。
- 約10cm離して使用
してください。

※ このスプレーは容器を逆さに
しても噴霧できます。



噴霧範囲*



* 患部から約10cm離して
使用した場合の目安です。



裏面に記載の「注意」をよくご覧ください。



このような症状のときに噴霧してください。

正面

(例)

背面

肩関節周囲炎
(五十肩)

筋肉痛

上腕骨上顆炎
(テニス肘など)

筋肉痛

腱・腱鞘炎

筋肉痛

変形性関節症
(膝関節症)

●の部位と
その周辺に噴霧
してください。

肩関節周囲炎
(五十肩)
筋肉痛

上腕骨上顆炎
(テニス肘など)

筋肉痛

腱・腱鞘炎

筋肉痛
(筋・筋膜性腰痛症)

筋肉痛

腱周囲炎

外傷後の腫脹、疼痛
(足くびの捻挫など)



三笠製薬株式会社

注意

- 傷口や眼、粘膜には使用しないでください。
万一、眼に入った場合は、直ちにきれいな
水で洗い流し、医師にご相談ください。
- 顔の近く(肩、頸部等)の吸入する
可能性のある部位では注意して
お使いください。
- この薬剤を使用したあとラップ
やガーゼ、包帯で密封しないで
ください。
- 使用後は、噴霧口を拭きとり、
きちんとキャップをしめて、涼しい
所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管
してください。
- 火気に近い所で保管、使用しない
でください。
- 化繊、絹、皮革、アクセサリー等に付着すると
変質することがあるので注意してください。
- 使用中に、皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があ
る場合には、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。

