

医薬品インタビューフォーム
日本病院薬剤師会のIF記載要領2013に準拠して作成

骨粗鬆症治療剤

ミノドロン酸錠50mg「三笠」
Minodronic Acid Tablets 50mg 「MIKASA」
(ミノドロン酸水和物錠)

剤 形	フィルムコーティング錠
製 剤 の 規 制 区 分	劇薬 処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）
規 格 ・ 含 量	1錠中 ミノドロン酸水和物50mg含有
一 般 名	和名：ミノドロン酸水和物（JAN） 洋名：Minodronic Acid Hydrate（JAN）
製 造 販 売 承 認 年 月 日 薬価基準収載・発売年月日	製造販売承認年月日：2018年2月15日 薬価基準収載年月日：2018年6月15日 販 売 年 月 日：2018年6月15日
開 発 ・ 製 造 販 売 (輸 入) ・ 提 携 ・ 販 売 会 社 名	製造販売元：三笠製薬株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問 い 合 わ せ 窓 口	三笠製薬株式会社 営業本部学術課 TEL：03-3557-7287 FAX：03-3994-7462 医療関係者向けホームページ https://www.mikasaseiyaku.co.jp/md

本IFは2023年1月改訂の電子添文の記載に基づき作成した。
最新の電子添文情報は、医薬品医療機器総合機構ホームページ
<https://www.pmda.go.jp/>にてご確認ください。

IF利用の手引きの概要－日本病院薬剤師会－

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約として医療用医薬品添付文書(以下、添付文書と略す)がある。医療現場で医師、薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和63年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第2小委員会が「医薬品インタビューフォーム」(以下、IFと略す)の位置付け並びにIF記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成10年9月に日病薬学術第3小委員会においてIF記載要領の改訂が行われた。

更に10年が経過し、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受け、平成20年9月に日病薬医薬情報委員会においてIF記載要領2008が策定された。

IF記載要領2008では、IFを紙媒体の冊子として提供する方式から、PDF等の電磁的データとして提供すること（e-IF）が原則となった。この変更にあわせて、添付文書において「効能・効果の追加」、「警告・禁忌・重要な基本的注意の改訂」などの改訂があった場合に、改訂の根拠データを追加した最新版のe-IFが提供されることとなった。

最新版のe-IFは、（独）医薬品医療機器総合機構の医薬品情報提供ホームページ（<http://www.pmda.go.jp>）から一括して入手可能となっている。日本病院薬剤師会では、e-IFを掲載する医薬品情報提供ホームページが公的サイトであることに配慮して、薬価基準収載にあわせてe-IFの情報を検討する組織を設置して、個々のIFが添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討することとした。

2008年より年4回のインタビューフォーム検討会を開催した中で指摘してきた事項を再評価し、製薬企業にとっても、医師・薬剤師等にとっても、効率の良い情報源とすることを考えた。そこで今般、IF記載要領の一部改訂を行いIF記載要領2013として公表する運びとなった。

2. IFとは

IFは「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等はIFの記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供されたIFは、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

[IFの様式]

- ①規格はA4版、横書きとし、原則として9ポイント以上の字体（図表は除く）記載し、一色刷りとする。ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。
- ②IF記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。
- ③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「IF利用の手引きの概要」の全文を記載するものとし、2頁にまとめる。

[IFの作成]

- ①IFは原則として製剤の投与経路別（内用剤、注射剤、外用剤）に作成される。
- ②IFに記載する項目及び配列は日病薬が策定したIF記載要領に準拠する。

- ③添付文書の内容を補完するとのIFの主旨に沿って必要な情報が記載される。
- ④製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。
- ⑤「IF記載要領2013」（以下、「IF記載要領2013」と略す）により作成されたIFは、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体（PDF）から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

[IFの発行]

- ①「IF記載要領2013」は、平成25年10月以降に承認された新医薬品から適用となる。
- ②上記以外の医薬品については、「IF記載要領2013」による作成・提供は強制されるものではない。
- ③使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果（臨床再評価）が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合にはIFが改訂される。

3. IFの利用にあたって

「IF記載要領2013」においては、PDFファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報をを利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則である。

電子媒体のIFについては、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、IFの原点を踏まえ、医療現場に不足している情報やIF作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、IFの利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IFが改訂されるまでの間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、IFの使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療機器情報提供ホームページで確認する。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等は承認事項に関わることがあり、その取扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

IFを薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。IFは日病薬の記載要領を受け、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。

また製薬企業は、IFがあくまでも添付文書を補完する情報資材であり、今後のインタビューフォームでの公開等を踏まえ、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。

（2013年4月改訂）

目 次

I. 概要に関する項目	1
1. 開発の経緯	1
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	1
II. 名称に関する項目	2
1. 販売名	2
2. 一般名	2
3. 構造式又は示性式	2
4. 分子式及び分子量	2
5. 化学名(命名法)	2
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	2
7. C A S 登録番号	2
III. 有効成分に関する項目	3
1. 物理化学的性質	3
2. 有効成分の各種条件下における安定性	3
3. 有効成分の確認試験法	3
4. 有効成分の定量法	3
IV. 製剤に関する項目	4
1. 剤形	4
2. 製剤の組成	4
3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意	4
4. 製剤の各種条件下における安定性	5
5. 調製法及び溶解後の安定性	6
6. 他剤との配合変化(物理化学的变化)	6
7. 溶出性	6
8. 生物学的試験法	9
9. 製剤中の有効成分の確認試験法	9
10. 製剤中の有効成分の定量法	9
11. 力価	9
12. 混入する可能性のある夾雑物	9
13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報	9
14. その他	9
V. 治療に関する項目	10
1. 効能又は効果	10
2. 用法及び用量	10
3. 臨床成績	11
VI. 薬効薬理に関する項目	12
1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群	12
2. 薬理作用	12
VII. 薬物動態に関する項目	13
1. 血中濃度の推移・測定法	13
2. 薬物速度論的パラメータ	15
3. 吸收	15
4. 分布	15
5. 代謝	16
6. 排泄	16
7. トランスポーターに関する情報	16
8. 透析等による除去率	16
VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目	17

1. 警告内容とその理由	17
2. 禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む）	17
3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由	17
4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由	17
5. 慎重投与内容とその理由	17
6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法	17
7. 相互作用	18
8. 副作用	18
9. 高齢者への投与	19
10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与	20
11. 小児等への投与	20
12. 臨床検査結果に及ぼす影響	20
13. 過量投与	20
14. 適用上の注意	20
15. その他の注意	20
16. その他	20
X. 非臨床試験に関する項目	21
1. 薬理試験	21
2. 毒性試験	21
X. 管理的事項に関する項目	22
1. 規制区分	22
2. 有効期間又は使用期限	22
3. 貯法・保存条件	22
4. 薬剤取扱い上の注意点	22
5. 承認条件等	22
6. 包装	22
7. 容器の材質	22
8. 同一成分・同効薬	22
9. 国際誕生年月日	23
10. 製造販売承認年月日及び承認番号	23
11. 薬価基準収載年月日	23
12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容	23
13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容	23
14. 再審査期間	23
15. 投薬期間制限医薬品に関する情報	23
16. 各種コード	23
17. 保険給付上の注意	23
X I. 文献	24
1. 引用文献	24
2. その他の参考文献	24
X II. 参考資料	24
1. 主な外国での発売状況	24
2. 海外における臨床支援情報	24
X III. 備考	25
その他の関連資料	25

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯

ミノドロン酸水和物は、経口ビスホスホネート系薬剤で、側鎖に環状のイミダゾピリジン基を配した化学構造を有し、骨吸収抑制作用、骨密度及び骨強度の低下に対する抑制効果を示すことが確認されている骨粗鬆症治療剤である。

コーパバイオテックペイ株式会社は『ミノドロン酸錠 50mg「三笠」』を後発医薬品として開発を企画し、薬食発 1121 第 2 号（2014 年 11 月 21 日）に基づき、規格及び試験方法を設定、安定性試験、生物学的同等性試験を実施し、2018 年 2 月 15 日に承認を取得した。その後、2019 年 7 月 18 日に三笠製薬株式会社に承継された。

2. 製品の治療学的・製剤学的特性

- (1) ミノドロン酸錠 50mg「三笠」は 1 錠中にミノドロン酸水和物 50mg を含有するごくうすい赤色のだ円形のフィルムコーティング錠である。
- (2) 錠剤本体両面に「ミノドロン 50 ミカサ」と記載し視認性を高めている。
- (3) PTP シートと台紙が一体化したパッケージで、保管時あるいは調剤時、錠剤が不用意に PTP から出てしまうことが無いように、PTP のアルミを台紙でカバーする構造である。開封部に取っ手を設け、台紙を剥がしやすくするとともに、取っ手部分はフック等に引っかけて保管することができる。
- (4) パッケージに服用日を記入することができる。
- (5) パッケージに飲み忘れ防止のためにカレンダー貼付用シールを貼付している。
- (6) 重大な副作用（頻度不明）として、上部消化管障害、顎骨壊死・顎骨骨髄炎、外耳道骨壊死、大腿骨転子下、近位大腿骨骨幹部、近位尺骨骨幹部等の非定型骨折、肝機能障害、黄疸が報告されている。また、類薬の重大な副作用として、低カルシウム血症が報告されている。
(「**VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目**」の「**8. (2) 重大な副作用と初期症状**」を参照)

II. 名称に関する項目

1. 販売名

(1) 和名

ミノドロン酸錠 50mg 「三笠」

(2) 洋名

Minodronic Acid Tablets 50mg 「MIKASA」

(3) 名称の由来

「主成分の一般名」 + 「剤形」 + 「含量」 + 「屋号」

2. 一般名

(1) 和名(命名法)

ミノドロン酸水和物 (JAN)

(2) 洋名(命名法)


Minodronic Acid Hydrate (JAN)、minodronic acid (INN)

(3) ステム

カルシウム代謝調節薬 : -dronic acid

3. 構造式又は示性式

構造式：



4. 分子式及び分子量

分子式： $C_9H_{12}N_2O_7P_2 \cdot H_2O$

分子量：340.16

5. 化学名（命名法）

[1-Hydroxy-2-(imidazo[1,2-*a*]pyridin-3-yl)ethylidene]bisphosphonic acid monohydrate

6. 慣用名、別名、略号、記号番号

特になし

7. CAS登録番号

155648-60-5 (Minodronic Acid Hydrate)

180064-38-4 (minodronic acid)

III. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質

(1) 外観・性状

白色～微帶赤白色の結晶又は結晶性の粉末である。

(2) 溶解性

該当資料なし

(3) 吸湿性

該当資料なし

(4) 融点（分解点）、沸点、凝固点

該当資料なし

(5) 酸塩基解離定数

該当資料なし

(6) 分配係数

該当資料なし

(7) その他の主な示性値

該当資料なし

2. 有効成分の各種条件下における安定性

該当資料なし

3. 有効成分の確認試験法

- 1) リン酸塩の定性反応
- 2) 紫外可視吸光度測定法
- 3) 赤外吸収スペクトル測定法

4. 有効成分の定量法

液体クロマトグラフィー

IV. 製剤に関する項目

1. 剤形

(1) 剤形の区別、外観及び性状

1) 剤形の区別

フィルムコーティング錠

2) 外観及び性状

販売名	ミノドロン酸錠 50mg 「三笠」			
性状	ごくうすい赤色のだ円形のフィルムコーティング錠			
外形				
直径(mm)	長径 : 13.2 短径 : 7.2			
厚さ(mm)	4.4			
重さ(mg)	310			

(2) 製剤の物性

該当資料なし

(3) 識別コード

本体に「ミノドロン 50 ミカサ」と記載

(4) pH、浸透圧比、粘度、比重、無菌の旨及び安定な pH 域等

該当しない

2. 製剤の組成

(1) 有効成分（活性成分）の含量

1錠中ミノドロン酸水和物 50mg 含有

(2) 添加物

D-マンニトール、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール 6000、酸化チタン、タルク、三二酸化鉄、カルナウバロウ

(3) その他

該当しない

3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意

該当しない

4. 製剤の各種条件下における安定性

試験名	保存条件	保存形態	保存期間	結果
加速試験 ¹⁾	40±1°C 75±5%RH	PTP シート (ポリプロピレンフィルム及びアルミニウム箔) +紙箱	6 カ月	変化なし

測定項目：性状、確認試験、製剤均一性、溶出性、類縁物質、含量、硬度、乾燥減量

<参考>ミノドロン酸錠 50mg 「三笠」 (旧処方製剤)

試験名	保存条件	保存形態	保存期間	結果
長期保存試験 ²⁾	25°C±2°C/ 60±5%RH	PTP シート (ポリプロピレンフィルム及びアルミニウム箔) +紙箱	36 カ月	変化なし
加速試験 ³⁾	40±1°C/ 75±5%RH	PTP シート (ポリプロピレンフィルム及びアルミニウム箔) +紙箱	6 カ月	変化なし

2) 測定項目：性状、確認試験、類縁物質、製剤均一性、溶出性、含量、硬度、乾燥減量

3) 測定項目：性状、確認試験、製剤均一性、溶出性、含量

○無包装状態における安定性⁴⁾

保存条件		保存形態	保存期間	結果
熱	40±2°C	遮光・気密容器 (ガラス瓶)	3 カ月	変化なし
湿度	25±2°C/ 75±5%RH	遮光・開放 (ガラス瓶)	3 カ月	30%以上の硬度低下がみられたが 19.6N 以上と判定基準内で、それ以外の試験項目は変化なし
光	約 2000 lx, 25°C	ガラスシャーレ (ポリ塩化ビニリデン 製フィルムで被覆)	120 万 lx・hr	変化なし

測定項目：性状、溶出性、硬度、含量

<参考>ミノドロン酸錠 50mg 「三笠」 (旧処方製剤)⁵⁾

保存条件		保存形態	保存期間	結果
熱	40±2°C	遮光・気密容器 (ガラス瓶)	3 カ月	変化なし
湿度	25±2°C/ 75±5%RH	遮光・開放 (ガラス瓶)	3 カ月	30%以上の硬度低下がみられたが 19.6N 以上と判定基準内で、それ以外の試験項目は変化なし
光	約 2000 lx, 25°C	ガラスシャーレ (ポリ塩化ビニリデン 製フィルムで被覆)	120 万 lx・hr	変化なし

測定項目：性状、溶出性、硬度、含量

○粉碎後における安定性⁴⁾

保存条件		保存形態	保存期間	結果
熱	40±2°C	遮光・気密容器 (ガラス瓶)	4週間	変化なし
湿度	25±2°C/ 75±5%RH	遮光・開放 (ガラス瓶)	4週間	変化なし
光	約 2000 lx, 25°C	ガラスシャーレ (ポリ塩化ビニリデン 製フィルムで被覆)	60万 lx・hr	変化なし

測定項目：性状、含量

<参考>ミノドロン酸錠 50mg 「三笠」(旧処方製剤)⁵⁾

保存条件		保存形態	保存期間	結果
熱	40±2°C	遮光・気密容器 (ガラス瓶)	4週間	変化なし
湿度	25±2°C/ 75±5%RH	遮光・開放 (ガラス瓶)	4週間	変化なし
光	約 2000 lx, 25°C	ガラスシャーレ (ポリ塩化ビニリデン 製フィルムで被覆)	60万 lx・hr	変化なし

測定項目：性状、含量

5. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

6. 他剤との配合変化（物理化学的変化）

該当しない

7. 溶出性

○処方変更前後における溶出挙動における同等性⁶⁾

ミノドロン酸錠 50mg 「三笠」について処方変更製剤と旧処方製剤の溶出挙動における同等性を検討するため、「経口固形製剤の処方変更の生物学的同等性試験ガイドライン(平成24年2月29日 薬食審査発0229第10号別紙3)」の第3章に基づき、「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」に従い溶出試験を実施し、すべての条件において同等であると判定された。


試験製剤	ミノドロン酸錠 50mg 「三笠」 (処方変更製剤)
組成	1錠中ミノドロン酸水和物 50mg を含む
剤形	フィルムコーティング錠
標準製剤	ミノドロン酸錠 50mg 「三笠」 (旧処方製剤)
溶出試験条件	パドル法／900mL／37±0.5°C／50rpm／界面活性剤なし
試験液	① pH1.2 : 日本薬局方溶出試験第1液 ② pH3.0 : 薄めた McIlvaine 緩衝液 ③ pH6.8 : 日本薬局方溶出試験第2液 ④ 水

なお、pH1.2 のパドル法 50 回転で 30 分以内に標準製剤、試験製剤ともに平均 85% 以上溶出したため、後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラインに従い 100 回転の試験を省略した。


判定基準

回転数	試験液	類似性の判定基準
50rpm	pH1.2	試験製剤が 15 分以内に平均 85% 以上溶出するか、又は 15 分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15% の範囲にある。
	pH3.0	
	pH6.8	
	水	
100rpm	pH1.2	


pH1.2




pH3.0



pH6.8



水



<参考>ミノドロン酸錠 50mg 「三笠」（旧処方製剤）と標準製剤の溶出挙動の比較⁷⁾

ミノドロン酸錠 50mg 「三笠」は、後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラインに基づき溶出試験を実施し、すべての条件において標準製剤と同等であると判定された。


試験製剤	ミノドロン酸錠 50mg 「三笠」（旧処方製剤）
組成	1錠中ミノドロン酸水和物 50mg を含む
剤形	フィルムコーティング錠
標準製剤	剤形：フィルムコーティング錠、含量：50mg／錠
溶出試験条件	パドル法／900mL／37±0.5°C／50rpm／界面活性剤なし
試験液	① pH1.2：日本薬局方溶出試験第1液 ② pH3.0：薄めた McIlvaine 緩衝液 ③ pH6.8：日本薬局方溶出試験第2液 ④ 水

なお、pH3.0 のパドル法 50 回転で 30 分以内に標準製剤、試験製剤とともに平均 85%以上溶出したため、後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラインに従い 100 回転の試験を省略した。


判定基準

回転数	試験液	類似性の判定基準
50rpm	pH1.2	試験製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出するか、又は 15 分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にある。
	pH3.0	
	pH6.8	
	水	
100rpm	pH3.0	


pH1.2




pH3.0



pH6.8



水



8. 生物学的試験法

該当資料なし

9. 製剤中の有効成分の確認試験法

紫外可視吸光度測定法

10. 製剤中の有効成分の定量法

液体クロマトグラフィー

11. 力価

本剤は力価表示に該当しない。

12. 混入する可能性のある夾雑物

該当資料なし

13. 注意が必要な容器・外観が特殊な容器に関する情報

該当しない

14. その他

特になし

V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果

骨粗鬆症

〈効能・効果に関連する使用上の注意〉

本剤の適用にあたっては、日本骨代謝学会の診断基準等を参考に、骨粗鬆症との診断が確定している患者を対象とすること。

2. 用法及び用量

通常、成人にはミノドロン酸水和物として 50mg を 4 週に 1 回、起床時に十分量（約 180mL）の水（又はぬるま湯）とともに経口投与する。

なお、服用後少なくとも 30 分は横にならず、飲食（水を除く）並びに他の薬剤の経口摂取も避けること。

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉

投与にあたっては次の点を患者に指導すること。

- (1) 本剤は水（又はぬるま湯）で服用すること。水以外の飲料（Ca、Mg 等の含量の特に高いミネラルウォーターを含む）、食物及び他の薬剤と一緒に服用すると、吸収を妨げがあるので、起床後、最初の飲食前に服用し、かつ服用後少なくとも 30 分は水以外の飲食を避ける。
- (2) 食道及び局所への副作用の可能性を低下させるため、速やかに胃内へと到達させることが重要である。服用に際しては、以下の事項に注意すること。
 - 1) 口腔咽頭刺激の可能性があるので、本剤を嚥んだり又は口中で溶かしたりしないこと。
 - 2) 十分量（約 180mL）の水（又はぬるま湯）とともに服用し、服用後 30 分は横たわらないこと。
 - 3) 就寝時又は起床前に服用しないこと。
- (3) 本剤は 4 週に 1 回服用する薬剤であるため、飲み忘れないように注意すること。本剤の服用を忘れた場合は、翌日に 1 錠服用すること。

3. 臨床成績

(1) 臨床データパッケージ

該当資料なし

(2) 臨床効果

該当資料なし

(3) 臨床薬理試験

該当資料なし

(4) 探索的試験

該当資料なし

(5) 検証的試験

1) 無作為化並行用量反応試験

該当資料なし

2) 比較試験

該当資料なし

3) 安全性試験

該当資料なし

4) 患者・病態別試験

該当資料なし

(6) 治療的使用

1) 使用成績調査・特定使用成績調査(特別調査)・

製造販売後臨床試験(市販後臨床試験)

該当資料なし

2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した試験の概要

該当しない

VII. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群

ビスホスホネート系薬剤

2. 薬理作用

(1) 作用部位・作用機序⁸⁾

ヒドロキシアパタイトに強い親和性をもち、骨表面に取り込まれ破骨細胞機能を抑制する。コレステロール合成経路であるメバロン酸経路のファルネシリピロリン酸合成酵素の阻害により、ファルネソールやゲラニルゲラニオールの生成を阻害する。これらは小分子 G 蛋白質をプレニル化し細胞膜への結合を促進し、活性化する役割を担っている。特に Rho ファミリーG 蛋白質のゲラニルゲラニル化の阻害が破骨細胞の波状縁形成や細胞内小胞輸送を抑制し破骨細胞機能を阻害するとともに、アポトーシスが促進される。

(2) 薬効を裏付ける試験成績

該当資料なし

(3) 作用発現時間・持続時間

該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移・測定法

(1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし


(2) 最高血中濃度到達時間

「VII. 薬物動態に関する項目」の「1. (3) 臨床試験で確認された血中濃度」を参照

(3) 臨床試験で確認された血中濃度

生物学的同等性試験⁹⁾

ミノドロン酸錠 50mg 「三笠」について処方変更製剤と旧処方製剤の生物学的同等性を検討するため、「経口固形製剤の処方変更の生物学的同等性試験ガイドライン（平成24年2月29日 薬食審査発0229第10号別紙3）」に基づき、ミノドロン酸錠 50mg 「三笠」の処方変更製剤と旧処方製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠（ミノドロン酸水和物として 50mg）健康閉経後女性に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC₀₋₄₈、Cmax）について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、それぞれ、log (0.9526) ~ log (1.1860) 及び log (0.9009) ~ log (1.1592) と、log (0.80) ~ log (1.25) の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。




	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₄₈ (ng · hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
ミノドロン酸錠 50mg 「三笠」 処方変更製剤	44.49±21.97	11.71±8.00	1.74±0.88	16.78±2.80
ミノドロン酸錠 50mg 「三笠」 旧処方製剤	42.71±23.69	11.25±7.65	1.52±0.86	17.02±3.17

(Mean±S.D., n=58)

血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

<参考>ミノドロン酸錠「三笠」（旧処方製剤）と標準製剤における生物学的同等性試験¹⁰⁾

ミノドロン酸錠 50mg 「三笠」 と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1錠（ミノドロン酸水和物として 50mg）健康閉経後女性に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、それぞれ log (0.8038) ~log (1.1088) 及び log (0.8312) ~log (1.1713) と、log (0.80) ~log (1.25) の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。



	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₂₈₈₀ (ng · min/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (min)	T _{1/2} (min)
ミノドロン酸錠 50mg 「三笠」	3906.76±1706.35	17.37±8.40	75±47	931±269
標準製剤 (錠剤、50mg)	4405.25±2561.14	18.58±11.13	85±43	954±206

(Mean±S.D., n=27)

血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(4) 中毒域

該当資料なし

(5) 食事・併用薬の影響

該当資料なし

(6) 母集団(ポピュレーション)解析により判明した薬物体内動態変動要因

該当資料なし

2. 薬物速度論的パラメータ

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) 吸収速度定数

該当資料なし

(3) バイオアベイラビリティ

該当資料なし

(4) 消失速度定数⁹⁾

0.043 ± 0.008 (hr^{-1})

(5) クリアランス

該当資料なし

(6) 分布容積

該当資料なし

(7) 血漿蛋白結合率

該当資料なし

3. 吸収

該当資料なし

4. 分布

(1) 血液-脳関門通過性

該当資料なし

(2) 血液-胎盤関門通過性

該当資料なし

(3) 乳汁への移行性

該当資料なし

(4) 髄液への移行性

該当資料なし

(5) その他の組織への移行性

該当資料なし

5. 代謝

(1) 代謝部位及び代謝経路

該当資料なし

(2) 代謝に関する酵素（CYP450 等）の分子種

該当資料なし

(3) 初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

(4) 代謝物の活性の有無及び比率

該当資料なし

(5) 活性代謝物の速度論的パラメータ

該当資料なし

6. 排泄

(1) 排泄部位及び経路

該当資料なし

(2) 排泄率

該当資料なし

(3) 排泄速度

該当資料なし

7. トランスポーターに関する情報

該当資料なし

8. 透析等による除去率

該当資料なし

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

1. 警告内容とその理由

該当しない

2. 禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む）

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

- (1) 食道狭窄又はアカラシア（食道弛緩不能症）等の食道通過を遅延させる障害のある患者〔本剤の食道通過が遅延することにより、食道局所における副作用発現の危険性が高くなる。〕
- (2) 服用時に上体を30分以上起こしていることのできない患者
- (3) 本剤の成分あるいは他のビスホスホネート系薬剤に対し過敏症の既往歴のある患者
- (4) 低カルシウム血症の患者〔血清カルシウム値が低下し低カルシウム血症の症状が悪化するおそれがある。〕
- (5) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目」の「10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）

3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由

「V. 治療に関する項目」の「1. 効能又は効果」の項参照

4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由

「V. 治療に関する項目」の「2. 用法及び用量」の項参照

5. 慎重投与内容とその理由

- (1) 嘔下困難、食道炎、胃炎、十二指腸炎、又は潰瘍等の上部消化管障害がある患者〔上部消化管粘膜に対し、刺激作用を示すことがあるので基礎疾患を悪化させるおそれがある。〕
- (2) 重篤な腎障害のある患者〔排泄が遅延するおそれがある。また、国内の医療情報データベースを用いた疫学調査において、骨粗鬆症の治療にビスホスホネート系薬剤を使用した腎機能障害患者のうち、特に、高度な腎機能障害患者（eGFR が 30mL/min/1.73m² 未満）で、腎機能が正常の患者と比較して低カルシウム血症（補正血清カルシウム値が 8mg/dL 未満）のリスクが増加したとの報告がある¹¹⁾]

6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法

- (1) 上部消化管に関する副作用が報告されているので、これらの症状があらわれた場合は、本剤の服用を中止して診察を受けるよう指導すること。
- (2) 骨粗鬆症の発症にエストロゲン欠乏、加齢以外の要因が関与しているものもあるので、治療に際してはこのような要因を考慮する必要がある。
- (3) 本剤投与後は、血清カルシウム値が低下する可能性があるため、血清カルシウムの変動に注意し、必要に応じて、カルシウム及びビタミンDを補給すること。ただし、カルシウム補給剤及びカルシウム、アルミニウム、マグネシウム含有製剤は、本剤の吸収を妨げることがあるので、服用時刻を変えて服用させること。（「VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目」の「7. 相互作用」の項参照）
- (4) ビスホスホネート系薬剤による治療を受けている患者において、頸骨壊死・頸骨骨髄炎があらわれることがある。報告された症例の多くが抜歯等の頸骨に対する侵襲的な歯科処置や局所感染に関連して発現している。リスク因子としては、悪性腫瘍、化学療法、血管新生阻害薬、コルチコステロイド治療、放射線療法、口腔の不衛生、歯科処置の既往等が知られている。本剤の投与開始前は口腔内の管理状態を確認し、必要に応じて、患者に対し

適切な歯科検査を受け、侵襲的な歯科処置をできる限り済ませておくよう指導すること。本剤投与中に侵襲的な歯科処置が必要になった場合には本剤の休薬等を考慮すること。

また、口腔内を清潔に保つこと、定期的な歯科検査を受けること、歯科受診時に本剤の使用を歯科医師に告知して侵襲的な歯科処置はできる限り避けることなどを患者に十分説明し、異常が認められた場合には、直ちに歯科・口腔外科を受診するように指導すること。

- (5) ビスホスホネート系薬剤を使用している患者において、外耳道骨壊死が発現したとの報告がある。これらの報告では、耳の感染や外傷に関連して発現した症例も認められることから、外耳炎、耳漏、耳痛等の症状が続く場合には、耳鼻咽喉科を受診するよう指導すること。
- (6) ビスホスホネート系薬剤を長期使用している患者において、非外傷性又は軽微な外力による大腿骨転子下、近位大腿骨骨幹部、近位尺骨骨幹部等の非定型骨折が発現したとの報告がある。これらの報告では、完全骨折が起こる数週間から数カ月前に大腿部、鼠径部、前腕部等において前駆痛が認められている報告もあることから、このような症状が認められた場合には、X線検査等を行い、適切な処置を行うこと。また、両側性の骨折が生じる可能性があることから、片側で非定型骨折が起きた場合には、反対側の部位の症状等を確認し、X線検査を行うなど、慎重に観察すること。X線検査時には骨皮質の肥厚等、特徴的な画像所見がみられており、そのような場合には適切な処置を行うこと。

7. 相互作用

(1) 併用禁忌とその理由

該当しない

(2) 併用注意とその理由

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
水以外の飲料、食物 特に牛乳や乳製品のような高カルシウム含有飲食物 多価陽イオン（カルシウム、鉄、マグネシウム、アルミニウム等）含有製剤 ミネラル入りビタミン剤 制酸剤 等	同時に服用すると本剤の吸収に影響を与えるおそれがあるので、本剤の服用後少なくとも30分は左記の飲食物や薬剤を摂取・服用しないよう、患者を指導すること。	本剤は多価陽イオンと錯体を形成することがあるので、併用すると本剤の吸収を低下させる。

8. 副作用

(1) 副作用の概要

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(2) 重大な副作用と初期症状

1) 重大な副作用（以下、全て頻度不明）

①上部消化管障害

十二指腸潰瘍、胃潰瘍等の上部消化管障害があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

②顎骨壊死・顎骨骨髄炎

顎骨壊死・顎骨骨髄炎があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常

が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

③外耳道骨壊死

外耳道骨壊死があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

④大腿骨転子下、近位大腿骨骨幹部、近位尺骨骨幹部等の非定型骨折

大腿骨転子下、近位大腿骨骨幹部、近位尺骨骨幹部等において非定型骨折を生じがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

⑤肝機能障害、黄疸

AST (GOT)、ALT (GPT) 等の上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

2) 重大な副作用(類薬)

低カルシウム血症

他のビスホスホネート系薬剤において痙攣、テタニー、しびれ、失見当識、QT延長等を伴う低カルシウム血症があらわれるとの報告があるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(3) その他の副作用

次の副作用があらわれることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

	頻度不明
過敏症	発疹、瘙痒、アレルギー性皮膚炎
消化器	胃・腹部不快感、腹痛、胃炎、逆流性食道炎、悪心 ^{注)} 、嘔吐 ^{注)} 、下痢、便秘、腹部膨満、消化不良、食欲不振、口内炎、口唇炎、口渴、歯肉痛、口の錯覚
血液	白血球減少、赤血球減少、血小板減少、単球増加
肝臓	AST (GOT) 上昇、ALT (GPT) 上昇、γ-GTP 上昇、ビリルビン上昇、アルカリホスファターゼ上昇、LDH 上昇
腎臓	BUN 上昇、尿酸上昇、クレアチニン上昇
筋・骨格系	アルカリホスファターゼ減少、血中カルシウム減少、CK (CPK) 上昇、筋・骨格痛 ^{注)} (関節痛、背部痛、筋肉痛、四肢痛、疼痛、骨痛等)
精神神経系	しびれ、坐骨神経痛、めまい、頭痛
その他	胸痛、コレステロール増加、脱毛、膀胱炎、副鼻腔炎、倦怠感 ^{注)} 、血圧上昇、血中リン上昇、血中リン減少、顔面浮腫、発熱 ^{注)}

注) 急性期反応（本剤投与後3日以内に発現し、通常は数日以内に回復する）に該当する副作用を含む。

(4) 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

該当資料なし

(5) 基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度

該当資料なし

(6) 薬物アレルギーに対する注意及び試験法

「VII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目」の「2. 禁忌内容とその理由(原則禁忌を含む)」及び「8. (3) その他の副作用」の項参照

9. 高齢者への投与

該当資料なし

10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1) 妊婦等

- 1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。〔他のビスホスホネート系薬剤と同様、生殖試験（ラット）において、低カルシウム血症による分娩障害の結果と考えられる母動物の死亡並びに出生率の低下等がみられている。〕
- 2) ビスホスホネート系薬剤は骨基質に取り込まれた後に全身循環へ徐々に放出されるので、妊娠する可能性のある婦人へは、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。〔全身循環への放出量はビスホスホネート系薬剤の投与量・期間に相関する。ビスホスホネート系薬剤の中止から妊娠までの期間と危険性との関連は明らかではない。〕

(2) 授乳婦

授乳中の婦人には、本剤投与中は授乳を中止させること。〔母動物（ラット）へ投与した場合、乳汁中に移行することが示されている。〕

11. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない（使用経験がない）。

12. 臨床検査結果に及ぼす影響

該当しない

13. 過量投与

症状：

低カルシウム血症、上部消化管障害（胃不調、胸やけ、食道炎、胃炎、又は胃潰瘍等）が発現する可能性がある。

処置：

吸収を抑えるために、多価陽イオンを含有する制酸剤あるいは牛乳を投与する。また、未吸収薬剤を除去するために胃洗浄を考慮する。なお、低カルシウム血症には必要に応じて、カルシウムの静脈内投与等の処置を行う。

14. 適用上の注意

薬剤交付時：

PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。（PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。）

15. その他の注意

該当しない

16. その他

該当しない

IX. 非臨床試験に関する項目

1. 薬理試験

(1) 薬効薬理試験

「VI. 薬効薬理に関する項目」参照

(2) 副次的薬理試験

該当資料なし

(3) 安全性薬理試験

該当資料なし

(4) その他の薬理試験

該当資料なし

2. 毒性試験

(1) 単回投与毒性試験

該当資料なし

(2) 反復投与毒性試験

該当資料なし

(3) 生殖発生毒性試験

該当資料なし

(4) その他の特殊毒性

該当資料なし

X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分

製 剤：ミノドロン酸錠 50mg 「三笠」：
劇薬、処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）
有効成分：ミノドロン酸水和物：劇薬

2. 有効期間又は使用期限

外箱等に表示 使用期限：3年（安定性試験結果に基づく）

3. 貯法・保存条件

室温保存、気密容器

4. 薬剤取扱い上の注意点

（1）薬局での取り扱い上の留意点について
該当資料なし

（2）薬剤交付時の取扱いについて（患者等に留意すべき必須事項等）

「V. 治療に関する項目」の「2. 用法及び用量（用法・用量に関連する使用上の注意）」の項を参照
「VII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目」の「6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法」の項を参照
「VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目」の「14. 適用上の注意」の項を参照

- ・患者向け医薬品ガイド：有り
- ・くすりのしおり：有り
- ・患者用指導箋：「X III. 備考 その他の関連資料」の項を参照

（3）調剤時の留意点について

該当しない

5. 承認条件等

該当しない

6. 包装

ミノドロン酸錠 50mg 「三笠」： PTP 2錠（1錠入り台紙※×2）
※患者様向け服用説明入り

7. 容器の材質

PTP シート：ポリプロピレン、アルミニウム

8. 同一成分・同効薬

（1）同一成分薬：

ボノテオ錠 1mg（アステラス製薬株式会社）、ボノテオ錠 50mg（アステラス製薬株式会社）、リカルボン錠 1mg（小野薬品工業株式会社）、リカルボン錠 50mg（小野薬品工業株式会社）

（2）同 効 薬：

アレンドロン酸ナトリウム水和物、リセドロン酸ナトリウム水和物、エチドロン酸二ナトリウム、イバンドロン酸ナトリウム水和物

9. 国際誕生年月日

2009年1月21日

10. 製造販売承認年月日及び承認番号

製造販売承認年月日：2018年2月15日

承認番号：23000AMX00344000

11. 薬価基準収載年月日

2018年6月15日

12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容

該当しない

13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容

該当しない

14. 再審査期間

該当しない

15. 投薬期間制限医薬品に関する情報

本剤は投薬（あるいは投与）期間に関する制限は定められていない。

16. 各種コード

販売名	HOT(13桁)番号	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	個別医薬品コード (YJコード)	レセプト電算 コード
ミノドロン酸錠 50mg「三笠」	1263589010101	3999026F2120	3999026F2120	622635801

17. 保険給付上の注意

該当しない

X I. 文献

1. 引用文献

- 1) 三笠製薬株式会社：社内資料（加速試験の安定性に関する資料（処方変更製剤））
- 2) 三笠製薬株式会社：社内資料（長期保存試験の安定性に関する資料（旧処方製剤））
- 3) 三笠製薬株式会社：社内資料（加速試験の安定性に関する資料（旧処方製剤））
- 4) 三笠製薬株式会社：社内資料（無包装・粉碎後の安定性に関する資料（処方変更製剤））
- 5) 三笠製薬株式会社：社内資料（無包装・粉碎後の安定性に関する資料（旧処方製剤））
- 6) 三笠製薬株式会社：社内資料（溶出性に関する資料（処方変更製剤））
- 7) 三笠製薬株式会社：社内資料（溶出性に関する資料（旧処方製剤））
- 8) 田中千賀子 他編：NEW 薬理学 改訂第7版 546、南江堂、(2017)
- 9) 三笠製薬株式会社：社内資料（生物学的同等性に関する資料（処方変更製剤））
- 10) 三笠製薬株式会社：社内資料（生物学的同等性に関する資料（旧処方製剤））
- 11) MID-NET[®]を用いた調査結果の概要（MID-NET[®]を用いたビスホスホネート製剤の腎機能障害患者における低カルシウム血症のリスク評価に関するデータベース調査）：<https://www.pmda.go.jp/files/000249186.pdf>

2. その他の参考文献

該当資料なし

X II. 参考資料

1. 主な外国での発売状況

該当しない

2. 海外における臨床支援情報

該当しない

X III. 備考

その他の関連資料

患者用指導箋：ミノドロン酸錠 50mg 「三笠」 を処方された方へ <A4 判>
(表面)

骨粗しょう症治療剤
ミノドロン酸錠50mg「三笠」
を処方された方へ

このお薬は
4週に1回1錠のむお薬です。



朝起きた後、なにかを飲食する前に
1錠をコップ1杯(約180cc)の水またはぬるま湯でかまずにのんでください。
口の中でお薬を**なめたり、溶かしたりしない**でください。



のんだ後、少なくとも**30分は横にならず、**
水以外の飲食や他のお薬も**のまない**でください。



製造販売元 三笠製薬株式会社

歯科・口腔外科を受診する場合は、裏面の切り取り線以下を先生にご提示ください。

これからこのお薬で治療される患者さんへ

- 医師、歯科医師と相談の上、できるかぎり抜歯などの歯科治療は、このお薬での治療を始める前に済ませてください。

このお薬で治療中の患者さんへ

- ブラッシングなどで口腔内を清潔に保ってください。
- 定期的な歯科検査を受けてください。
- 抜歯などの歯科治療はできるかぎり避けるようにしてください。
- 下記の症状があらわれた場合は、医師、歯科医師、薬剤師などにご相談ください。
・あごの痛み ・歯のゆるみ ・歯ぐきの腫れ など

(裏面)

骨粗しょう症治療剤
ミドロニ酸錠50mg「三笠」
を処方された方へ

のみ忘れた時は、**気づいた日**の**翌朝**に**1錠** のんでください。

次からは、決められた日にのんでください。

***同じ日に2錠(2回分)**を一度に**のまない**でください。

胸やけなどや、足の付け根、太ももなどに
痛みを感じた場合には、すぐに医師または薬剤師に
ご相談ください。



取り扱い上の注意

- 直射日光のあたる場所など、高温での保管はしないでください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 自分以外の方(家族、知人等)に、このお薬を譲らないでください。

歯科・口腔外科を受診する場合は、下記を先生にご提示ください。

キリトリ

歯科・口腔外科の先生方へ

患者さんは
ビスホスホネート系薬剤の
治療を受けているか、
受けたことがあります。

- 口腔内を清潔に保つよう、ご指導ください。
- 顎骨壊死・顎骨骨髓炎があらわれることがあるため、抜歯等の顎骨に対する侵襲的な歯科処置はできるかぎり避けてください。
- 処方の変更や中止の要否を処方医にご相談ください。
- 異常を感じた場合には、すみやかに受診するようご説明ください。

医療機関名

製造販売元 三笠製薬株式会社



三笠製薬株式会社
東京都練馬区豊玉北2-3-1