

セロキシブ錠「三笠」を服用される患者さんへ

このお薬はプロスタグランジンという炎症にかかわる物質の生成を抑え、痛みをやわらげます。

セロキシブ錠100mg「三笠」



セロキシブ錠200mg「三笠」



! 以下に該当する方は、
服用前に**主治医**または**薬剤師**にお伝えください。

- 以前にお薬を服用して、**喘息、かゆみ、発疹などのアレルギー症状**が出たことがある
- 胃潰瘍などの**胃腸の病気**がある
- **心臓、肝臓または腎臓の病気**がある
- 以前に**心臓のバイパス手術**などを受けたことがある、または受ける予定がある
- **妊婦、妊娠**している可能性がある、または**授乳中**である
- **他のお薬**を飲んでいる

服用上の注意

- **主治医に指示された用法・用量を守ってください。**
- **飲み忘れた場合**は、気がついた時にできるだけ早く**1回分**を飲んでください。ただし、次の服用時間が近い場合は1回分とばして、次に飲む時間に1回分を飲んでください。
- **2回分を一度に飲まないでください。**
- **誤って多く飲んだ場合**は、主治医または薬剤師にご相談ください。
- 主治医または薬剤師の指示なしに、**自分の判断で飲むのを止めないでください。**

取扱い上の注意

- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- お薬が残った場合は、保管しないで廃棄してください。
- 自分以外の方(家族、友人等)にこのお薬を譲らないでください。

裏面も必ず
お読みください

服用中の注意

めまいや傾眠(ぼんやりする、うとうとする)などの症状があらわれることがあります。

服用中は**自動車の運転**などの危険を伴う作業をするときには、十分注意してください。



副作用について

このお薬を飲むと、次のような症状があらわれることがあります。
そのような時は、**主治医または薬剤師にご相談ください。**



腹痛、下痢



吐き気



口内炎



発疹

また、次のような症状があらわれたら服用を止めて、**すぐに主治医の診察を受けてください。**

➡ 胸の痛み

➡ ろれつがまわらない

➡ 体の片側または一部のまひ

➡ 息切れ、呼吸困難

上記以外にも気になる症状がありましたら
主治医または薬剤師にご相談ください。

連絡先(医療機関名)