


ラクティオンパップ[®] 70mgをお使いの患者様へ (上手な貼り方)




はじめに中央を折り曲げて
ください。

1



つぎに①のフィルムを
はがしてください。

2



はがした面を患部に貼って
ください。

3



②のフィルムを
はがしながら貼ってください。

4



裏面もご覧ください ▶

使用上の注意

- 以前にぜんそく発作を起こしたことがある方や現在ぜんそくの方、また以前にこの薬の使用により皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状を起こしたことがある方は使用前に担当医師・薬剤師に相談してください。
- 傷口や粘膜、湿しんや発しんの部位には使用しないでください。
- この薬をはったあと、かゆみ、発赤、発しん、かぶれ、ヒリヒリ感などの症状があらわれたときは、担当医師・薬剤師に相談してください。
- 入浴の30分以上前にはがしてください。
- 本剤に触れた手で、眼、鼻、口などの粘膜に触れないように注意してください。

保管および取扱い上の注意

- 開封後はチャックをしめて、直射日光、高温の場所(車内など)を避けて保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。

はり方

- 患部が汗、脂、汚れなどのためにつきにくいことがありますので、よくふき取ってからはってください。