


スミル[®]スチック3%の上手な使い方



キャップを回して開けます。



容器のダイヤル(底部)を回して、
薬剤を4~5mm出します。



痛いところを中心にして、適量を
まんべんなくすり込みます。

お使いになる場合には、
容器を正しく
ご使用いただくため、
よくお読みください。



ダイヤルを
回して戻す。

使用後は容器のダイヤル(底部)
を回して、薬剤を戻します。



しっかりと閉める。

薬剤が完全に容器に戻ったこと
を確認して、**キャップをしっかりと**
閉めてください。その後、直射日
光の当たらない涼しいところに
保管してください。

注意▶

薬剤底部の受け皿が見え、皿の上面が露出するようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください(受け皿が皮膚に当たり、傷つける恐れがあります)。薬剤の量は受け皿を除き表示量確保されております。なお、薬剤を出し終わるとダイヤルは空回りする構造になっております。

使用上の注意

- 以前にぜんそく発作を起こしたことがある方や現在ぜんそくの方、また以前にこの薬の使用により皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状を起こしたことがある方は使用前に担当医師・薬剤師に相談してください。
- 傷口や眼、粘膜には使用しないでください。
- この薬を塗った患部を通気性の悪いもので包まないでください。
- この薬を使ったあと、かゆみ、かぶれ、発赤、ヒリヒリ感などの症状があらわれたときは、担当医師・薬剤師に相談してください。

保管および取扱い上の注意

- 揮発性があるので、使用後はキャップをしっかりと閉めて、直射日光、高温の場所(車内など)を避けて保管してください。
- 火気に近づけないでください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 塗料(家具、塗装床、アクセサリー等)、化繊、絹、皮革等に付着すると変質することがあるので注意してください。
- 処方された患者さん以外の方は使用しないでください。