

プレガバリンOD錠「三笠」を服用される患者さんへ

□ プレガバリンOD錠 25mg「三笠」



□ プレガバリンOD錠 50mg「三笠」



□ プレガバリンOD錠 75mg「三笠」



□ プレガバリンOD錠 150mg「三笠」



- このお薬は神経の痛みに対するお薬です。
- 痛いときにだけ服用するのではなく、一定期間服用を続けることで効果を発揮します。また、お薬の量は少しずつ増やしていきます。
- 痛みが軽減してきたら、お薬を少しずつ減らしていくことも可能です。

お薬の量や服用方法等についてはご自身で判断せず、必ず主治医にご相談ください。

OD錠の服用方法

- OD錠は、唾液のみ(水なし)で口の中で溶けるお薬です。
- 苦みを感じる場合は、少量の水で服用することをお勧めします。

服用上の注意

- **主治医に指示された用法・用量を守ってください。**
- **飲み忘れた場合**は、気がついた時にできるだけ早く**1回分**を飲んでください。ただし、次に通常に飲む時間が近い場合は1回分とばして、**次に飲む時間から1回分**を飲んでください。
- **2回分を一度に飲まないでください。**
- **誤って多く飲んだ場合**は、主治医または薬剤師にご相談ください。
- **アルコール(飲酒)**はお薬の作用を強めることがありますので、注意してください。

！ 以下に該当する方は服用前に主治医または薬剤師にお伝えください ！

- ▶ 以前にお薬を服用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ▶ 腎臓が悪い、透析を受けている。
- ▶ 心臓が悪い。
- ▶ 妊婦、妊娠している可能性がある、または授乳中である。
- ▶ 他のお薬を飲んでいる。

裏面も必ず
お読みください▶

服用中の注意と副作用について

めまいや眠気などがあらわれることがあります。
特に高齢の方は、転倒の危険がありますので、十分に注意してください。
服用中は事故の危険がありますので、自動車の運転などの危険を伴う作業を行わないでください。



このお薬を飲むと、次のような症状があらわれることがあります。
そのような時は、主治医または薬剤師にご相談ください。



体重増加



吐き気



むくみ



発疹

その他にも次の症状があらわれたら服用を止めて、すぐに主治医の診察を受けてください。

- 胸の痛み
- 意識消失
- 息切れ、呼吸困難
- など

取扱い上の注意

- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- お薬が残った場合は、保管しないで廃棄してください。
- 自分以外の方(家族、友人等)にこのお薬を譲らないでください。

気になることがありましたら、主治医または薬剤師にご相談ください。

連絡先(医療機関名)