


# フェルビナク スチック軟膏3%「三笠」 を使用される患者さんへ

1



キャップを回して開けます。

2



容器のダイヤル(底部)を回して、  
薬剤を4~5mm出します。

3



痛いところを中心にして、適量を  
まんべんなくすり込みます。

4



ダイヤルを  
回して戻す。

使用後は容器のダイヤル(底部)  
を回して、薬剤を戻します。

5



しっかりと閉める。

薬剤が完全に容器に戻ったことを確認して、**キャップをしっかりと閉めてください**。その後、直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。

お使いになる場合には、  
容器を正しく  
ご使用いただくため、  
よくお読みください。



**注意**▶

薬剤底部の受け皿が見え、皿の上面が露出するようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください(受け皿が皮膚に当たり、傷つける恐れがあります)。薬剤の量は受け皿を除き表示量確保されています。なお、薬剤を出し終わるとダイヤルは空回りする構造になっております。

## 使用上の注意

- 次のような方は使用前に必ず担当の医師・薬剤師に相談してください。
    - アスピリン喘息またはその既往歴、気管支喘息がある。
    - 以前に薬を使用して、皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状を起こしたことがある。
    - 妊婦または授乳中である。
    - 他に薬などを使っている。
  - 重大な副作用として、ショック、アナフィラキシー（蕁麻疹、血管浮腫、呼吸困難等）があらわれることがあります。
  - その他の副作用として、かゆみ、皮膚炎、発赤、接触皮膚炎（かぶれ）、ヒリヒリ感、水疱などが報告されています。
- このような症状に気づいたら担当の医師・薬剤師に相談してください。
- 傷口や眼、粘膜には使用しないでください。
  - この薬を塗った患部を通気性の悪いもので覆わないでください。

## 保管および取扱い上の注意



使用後はキャップをしっかりと閉めてください。



直射日光、高温になる場所を避け、室温（1～30度）で保管してください。



火気に近づけないでください。



家具、塗装床、アクセサリーや化繊、絹、皮革等に付着すると変質することがあるので、注意してください。



子供の手の届かない所に保管してください。



処方された患者さん以外の方は使用しないでください。