

骨粗しょう症治療剤

# ミドロン酸錠50mg「三笠」

を処方された方へ

このお薬は  
**4週に1回1錠**のむお薬です。



朝起きた後、なにかを飲食する前に

**1錠**を**コップ1杯**(約180cc)の  
**水**または**ぬるま湯**で**かまずに**のんでください。

口の中でお薬を**なめたり**、  
**溶かしたりしない**でください。



のんだ後、少なくとも**30分は横にならず**、  
水以外の飲食や他のお薬も**のまない**でください。

製造販売元  三笠製薬株式会社

歯科・口腔外科を受診する場合は、裏面の切り取り線以下を先生にご提示ください。

キトリ

これからこのお薬で  
治療される患者さんへ

- 医師、歯科医師と相談の上、できるかぎり抜歯などの歯科治療は、このお薬での治療を始める前に済ませてください。

このお薬で  
治療中の患者さんへ

- ブラッシングなどで口腔内を清潔に保ってください。
- 定期的な歯科検査を受けてください。
- 抜歯などの歯科治療はできるかぎり避けるようにしてください。
- 下記の症状があらわれた場合は、医師、歯科医師、薬剤師などにご相談ください。
  - ・ あごの痛み ・ 歯のゆるみ ・ 歯ぐきの腫れ など

骨粗しょう症治療剤

**ミドロン酸錠50mg「三笠」**

を処方された方へ

のみ忘れた時は、**気づいた日**の**翌朝**に**1錠**のんでください。

次からは、決められた日にのんでください。

※ **同じ日**に**2錠(2回分)**を一度に**のまない**でください。

胸やけなどや、足の付け根、太ももなどに  
痛みを感じた場合には、すぐに医師または薬剤師に  
ご相談ください。



### 取り扱い上の注意

- 直射日光のあたる場所など、高温での保管はしないでください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 自分以外の方(家族、知人等)に、このお薬を譲らないでください。

歯科・口腔外科を受診する場合は、下記を先生にご提示ください。

キリトリ

### 歯科・口腔外科の先生方へ

患者さんは  
ビスホスホネート系薬剤の  
治療を受けているか、  
受けたことがあります。

- 口腔内を清潔に保つよう、ご指導ください。
- 顎骨壊死・顎骨骨髓炎があらわれることがあるため、抜歯等の顎骨に対する侵襲的な歯科処置はできるかぎり避けてください。
- 処方の変更や中止の可否を処方医にご相談ください。
- 異常を感じた場合には、すみやかに受診するようご説明ください。

医療機関名