


スティックゼノール[®]Aを使用される患者さんへ

1



キャップを回して開けます。

2



容器の底部を押し上げて、薬剤を4～5mm出します。

3




痛いところを中心にして、適量をまんべんなくすり込みます。

4



使用後は薬剤を押しつけて容器に戻します。

5



薬剤が完全に容器に戻ったことを確認して、**キャップをしっかりと閉めて**ください。その後、直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。

お使いになる場合には、
容器を正しく
ご使用いただくため、
よくお読みください。




スティック剤とは

- 薬剤をすり込む際は容器から押し出して、そのまま使用することができます。
- 一旦薬剤を手にとる必要がなく、患部以外への不必要な投与が避けられます。

注意事項

- 湿疹・発疹の部位、損傷皮膚、粘膜、眼または眼の周囲には使用しないでください。
- 本剤の使用により、皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には使用を中止し、医師などにご相談ください。

保管および取扱い上の注意



使用後はキャップをしっかり閉めてください。



直射日光、高温になる場所を避け、室温（1～30度）で保管してください。



火気に近づけないでください。



家具、塗装床、アクセサリや化繊、絹、皮革等に付着すると変質することがあるので、注意してください。



子供の手の届かない所に保管してください。



処方された患者さん以外の方は使用しないでください。

受け皿



薬剤底部の受け皿が見え、皿の上面が露出するようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください（受け皿が皮膚に当たり、傷つける恐れがあります）。