

# フェルビナクローション3%「三笠」を使用される患者さんへ

このローションは炎症に伴うはれや痛みを和らげるお薬です。

## 使用法

- 痛いところとその周りに塗ってください。
- スポンジを軽く肌に押しつけるように塗ってください。
- 1日数回(3~4回)塗ってください。

(使用量、使用回数は医師とご相談のうえで使用ください。)

※ 裏面に記載の「注意」をよくご覧ください。



このような症状のときに塗ってください。

正面

(例)

背面

肩関節周囲炎  
(五十肩)

筋肉痛


上腕骨上顆炎  
(テニス肘など)

筋肉痛

腱・腱鞘炎

筋肉痛

変形性関節症  
(膝関節症)

 の部位と  
その周辺に塗って  
ください。

肩関節周囲炎  
(五十肩)  
筋肉痛

上腕骨上顆炎  
(テニス肘など)

筋肉痛

腱・腱鞘炎



筋肉痛  
(筋・筋膜性腰痛症)

筋肉痛

腱周囲炎

外傷後の腫脹、疼痛  
(足くびの捻挫など)

## 注意

- 傷口や眼、粘膜には使用しないでください。  
(薬剤を使用した手で、傷口や眼、粘膜にさわらないように注意をしてください。)
- この薬剤を使用したあと、ラップやガーゼ、包帯で密封しないでください。
- 使用後はきちんとキャップをしめて、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 火気に近づけないでください。
- 化繊、絹、皮革、アクセサリ等に付着すると変質することがあるので注意してください。
- 使用中に、皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。