

トアラセット[®]配合錠「三笠」を服用される患者さんへ

トラマドール



アセト
アミノフェン

このお薬は長引く痛みを抑えるお薬です。

トラマドールと**アセトアミノフェン**という、痛みを抑える2つの有効成分が配合されたお薬です。

他のお薬にこれらと同じ有効成分を含む場合もありますので、病院や薬局でお薬をもらう時は、主治医・薬剤師に本剤を服用していることをお伝えください。特にアセトアミノフェンは市販の風邪薬や解熱鎮痛薬に含まれていることがあります。十分に注意し、分からないことがあれば主治医または薬剤師にご相談ください。

服用上の注意

- 通常は1回1錠、1日4回服用ですが、主治医に指示された用法・用量を守ってください。
- 服用間隔は**4時間以上**あけてください。
- 1回2錠、1日8錠を超えて服用しないでください。
- 空腹時の服用はできるだけ避けてください。
- 飲み忘れた時は、気が付いた時にできるだけ早く1回分飲んでください。ただし、次の服用は4時間以上空けて飲んでください。**絶対に2回分を1度に飲まないよう注意してください。**
- 誤って多く飲んだ場合は、主治医または薬剤師にご相談ください。
- 飲酒は避けてください。**アルコールにより副作用が出やすくなります。
- 自分の判断で服用を中止しないでください。**
- 1日4錠を超す高用量で、長期投与する場合は、定期的に肝機能検査を受けてください。**

服用上の注意

- 小児の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- お薬が残った場合は保管しないで廃棄してください。
- 他の人にあげることは絶対に避けてください。



お薬を飲んだ日

飲み忘れや重複して飲むことを避けるため、飲んだ日を記入し、錠数を丸で囲み、また、寝る前の痛みの強さを右端に記入してください(下の数値評価スケールを参考にしてください)。

日付	朝	昼	夜	寝る前	寝る前の痛みの強さ
/	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	
/	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	
/	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	
/	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	
/	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	
/	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	
/	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	

日付	朝	昼	夜	寝る前	寝る前の痛みの強さ
/	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	
/	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	
/	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	
/	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	
/	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	
/	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	
/	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	
/	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	1錠 2錠	

痛みの強さ : NRS (Numeric Rating Scale) 数値評価スケール




痛みがない

想像できる最大の痛み

副作用について

このお薬を飲みはじめると、以下のような副作用が出ることがあります。このような副作用に対処するためのお薬と一緒に出されることがあります。主治医または薬剤師の指示に従って服用してください。




便秘

下剤を服用することもあります。



吐き気・嘔吐

吐き気を止めるお薬を服用することもあります。



眠気・めまい

投与中は自動車の運転等危険を伴う機械の操作は避けてください。

医療機関名