

フェルビナクローション3%「三笠」を使用される患者さんへ

このローションは炎症に伴うはれや痛みを和らげるお薬です。

使用法

- 痛いところとその周りに塗ってください。
- スポンジを軽く肌に押しつけるように塗ってください。
- 1日数回(3~4回)塗ってください。

(使用量、使用回数は医師とご相談のうえで使用ください。)

※ 裏面に記載の「注意」をよくご覧ください。



このような症状のときに塗ってください。

正面

(例)

背面

肩関節周囲炎
(五十肩)

筋肉痛

上腕骨上顆炎
(テニス肘など)

筋肉痛

腱・腱鞘炎

筋肉痛

変形性関節症
(膝関節症)

●の部位と
その周辺に塗って
ください。

肩関節周囲炎
(五十肩)
筋肉痛

上腕骨上顆炎
(テニス肘など)

筋肉痛

腱・腱鞘炎



筋肉痛
(筋・筋膜性腰痛症)

筋肉痛

腱周囲炎

外傷後の腫脹、疼痛
(足くびの捻挫など)

注意

- 傷口や眼、粘膜には使用しないでください。
(薬剤を使用した手で、傷口や眼、粘膜にさわらないように注意をしてください。)
- この薬剤を使用したあと、ラップやガーゼ、包帯で密封しないでください。
- 使用後はきちんとキャップをしめて、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 火気に近づけないでください。
- 化繊、絹、皮革、アクセサリー等に付着すると変質することがあるので注意してください。
- 使用中に、皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。



三井製薬株式会社