

骨粗しょう症治療剤

ミドロン酸錠50mg「三笠」を処方された方へ

のみ方とご注意

このお薬は**4週に1回1錠**のお薬です。

歯医者さんで治療を受ける場合、
必ずこのお薬をのんでいることを伝えてください
(この文書を歯医者さんに見せてください)。

【 歯科・口腔外科の先生へ 】
本剤はビスホスホネート系薬剤です。



原寸大
(錠剤)



表

裏

側面1

側面2

お取り扱い上のご注意

- ・ 直射日光のあたる場所など、高温での保管はしないでください。
- ・ お子様の手の届かないところに保管してください。
- ・ 自分以外の方(家族、知人等)に、このお薬を譲らないでください。

骨粗しょう症治療剤 **ミドロン酸錠50mg**「三笠」を処方された方へ

のみ方のご注意

- 【のみ方】 朝起きた後、なにかを飲食する前に1錠をコップ1杯(約180cc)の水またはぬるま湯でかまずにのんでください。
口の中でお薬をなめたり、溶かしたりしないでください。
- 【のんだ後】 少なくとも30分は横にならず、水以外の飲食や他のお薬ものまないでください。
- 【のみ忘れた時】 気づいた日の翌朝に1錠のんでください。
次からは、決められた日にのんでください。
※同じ日に2錠(2回分)を一度にのまないでください

胸やけなどや、足の付け根、太ももなどに痛みを感じた場合には、
すぐに医師または薬剤師にご相談ください。