

2020年2月

お客様 各位

経皮複合消炎剤

ゼスタッククリーム[®]

患者様用指導箋変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社下記製品につきまして、製品に同梱されております患者様用指導箋（ゼスタッククリームの使い方）の記載内容を一部変更させて頂くこととなりましたので、ご案内申し上げます。

しばらくの間、新旧製品が市場に流通し、多々ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■ 変更対象品目

品名	包装規格	統一商品コード	変更開始ロット	使用期限	出荷開始予想時期
ゼスタッククリーム	25g×10本	387-597728	001201	2022.06	2020年3月上旬
	25g×50本	397-599814	001211	2022.06	2020年3月上旬
	50g×10本	387-599975	002131	2022.07	2020年4月上旬
	50g×50本	387-599821	002141	2022.07	2020年3月中旬

※現行品の在庫状況により、変更品の出荷開始時期が前後する可能性がございますので、予めご了承願います。

※詳細等につきましては弊社販売担当者へお問い合わせください。

■ 変更内容

患者様用指導箋（ゼスタッククリームの使い方）の記載内容を一部変更致しました。

詳しくは裏面をご参照ください。

<変更理由>

適正使用の観点から、わかりやすい表現へ変更させて頂きました。

製造販売元



三葎製薬株式会社

東京都練馬区豊玉北2-3-1

現行

変更後

表

表

ゼスタッククリームの使い方

ゼスタッククリームの使い方

【使用法】

【使用法】

- 痛いところを中心に、マッサージしながらクリームの白い色が消えるまで、よくすり込んでください。
- 関節に使用する場合は、関節の周り全体にすり込んでください。
- 特に入浴後の使用は効果的です。


- 痛いところに、クリームの白い色が消えるまで、よくすり込んでください。
- 関節に使用する場合は、関節の周り全体にすり込んでください。

【使用量の目安】

【使用量の目安】

- 1回量は患部により異なります。次の量を参考にして、チューブから取り出してください。

指……………	指1本幅
ひじや手首……………	指2本幅
ひざや肩、腰……………	指3本幅



(指3本幅の場合)

指などの小さな患部……………	指1本幅
ひじや手首……………	指2本幅
ひざや肩、腰……………	指3本幅



【使用回数】

- 1日数回（3～4回）使用してください。
- ※使用回数・使用量は、医師とご相談のうえご使用ください。

【使用回数】 1日3～4回が基準です。

裏

裏

注 意

注 意

- 眼、口の中などの粘膜、傷口には使用しないでください。また、本剤を使用した手で、そのまま眼、粘膜、傷口にふれないよう注意してください。
- ご使用により、皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 直射日光をさけ、なるべく涼しい所にキャップをきちんとしめて保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。

- 眼、口の中などの粘膜、傷口には使用しないでください。また、本剤を使用した手で、そのまま眼、粘膜、傷口にさわらないよう注意してください。
- 直射日光の当たらない涼しい所に、キャップをきちんとしめて保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- ご使用により、皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。