

使用上の注意改訂のお知らせ

指定医薬品	胃炎・消化性潰瘍治療剤 ガタンブル錠 25mg (ピレンゼピン塩酸塩水和物製剤)
-------	---

この度、弊社製品『ガタンブル錠 25mg』（有効成分：ピレンゼピン塩酸塩水和物）につきまして、自主改訂により、【使用上の注意】を以下のように改訂させていただきますのでお知らせ申し上げます。

販売元



三井製薬株式会社
東京都練馬区豊玉北2-3-1

製造販売元



ニプロジェネファ株式会社

埼玉県春日部市南栄町7番地5

改訂後（ <u> </u> 下線：追加）	改訂前
<p>【使用上の注意】</p> <p>1～6 省略（変更なし）</p> <p>7. <u>過量投与</u></p> <p>（1）<u>症状</u></p> <p><u>過量投与した場合、抗コリン作用によるとみられる口渇、せん妄、頻脈、イレウス、尿閉等があらわれることがある。</u></p> <p>（2）<u>処置</u></p> <p><u>通常早期には、活性炭の投与、胃洗浄等を行う。また、必要に応じ、副交感神経興奮薬の投与および尿閉の場合の導尿等、適切な支持療法を行うこと。</u></p> <p>8. <u>適用上の注意</u></p> <p><u>薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。[PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]</u></p>	<p>【使用上の注意】</p> <p>1～6 省略</p> <p>7. <u>適用上の注意</u></p> <p><u>薬剤交付時：PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。[PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]</u></p>

※【使用上の注意】以外にも改訂箇所がございます。詳細は改訂添付文書をご覧ください。

「薬食安発第0324006号 平成18年3月24日 後発医薬品に係る情報提供の充実について」に基づく改訂等です。

使用上の注意に関するお問合せは下記までお願い致します。

ニプロジェネファ株式会社 安全管理グループ

TEL：048-754-8716、FAX：048-754-8776、E-mail：pms@nipro-genepha.co.jp