

スミルスチック3%の上手な使い方



キャップを回して開けます。



容器のダイヤル(底部)を回して、薬剤を4~5mm出します。



痛いところを中心にして、適量をまんべんなくすり込みます。

お使いになる場合には、
容器を正しく
ご使用いただきため、
よくお読みください。



使用後は容器のダイヤル(底部)を回して、薬剤を戻します。



薬剤が完全に容器に戻ったことを確認して、**キャップをしっかりと閉めてください**。その後、直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。

注意▶ 薬剤底部の受け皿が見え、皿の上面が露出するようになったら、本剤の使用をやめてください。
また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。なお、薬剤を出し終わるとダイヤルは空回ります。

❖ 使用上の注意 ❖

- 以前にぜんそく発作を起こしたことのある方や現在ぜんそくの方、また以前にこの薬の使用により皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状を起こしたことのある方は使用前に担当医師・薬剤師に相談してください。
- 傷口や眼、粘膜には使用しないでください。
- この薬を塗った患部を通気性の悪いもので包まないでください。
- この薬を使ったあと、かゆみ、かぶれ、発赤、ヒリヒリ感などの症状があらわれたときは、担当医師・薬剤師に相談してください。

❖ 保管および取扱い上の注意 ❖

- 挿発性があるので、使用後はキャップをしっかりと閉めて、直射日光、高温の場所（車内など）を避けて保管してください。
- 火気に近づけないでください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 塗料（家具、塗装床、アクセサリー等）、化繊、絹、皮革等に付着すると変質があるので注意してください。
- 処方された患者さん以外の方は使用しないでください。