

## 使用上の注意改訂のお知らせ

持続性抗炎症・鎮痛剤

**ルメリーム®カプセル10**  
**ルメリーム®カプセル20**

(ピロキシカム製剤)

販売元



**三井製薬株式会社**  
東京都練馬区豊玉北2-3-1

製造販売元



**ニプロジェネファ株式会社**  
埼玉県春日部市南栄町7番地5

この度、弊社製品『ルメリームカプセル10』及び『ルメリームカプセル20』は、自主改訂により【使用上の注意】を以下のように改訂させていただきますので、お知らせ申し上げます。

改訂後 ( 下線：追加・変更 )			改訂前		
<b>【使用上の注意】</b> 1. 慎重投与 ( 次の患者には慎重に投与すること ) 省略 ( 変更なし )  2. 重要な基本的注意 省略 ( 変更なし )			<b>【使用上の注意】</b> 1. 慎重投与 ( 次の患者には慎重に投与すること ) 省略  2. 重要な基本的注意 省略		
3. 相互作用 ( 1 ) 併用禁忌 ( 併用しないこと ) 省略 ( 変更なし ) ( 2 ) 併用注意 ( 併用に注意すること )			3. 相互作用 ( 1 ) 併用禁忌 ( 併用しないこと ) 省略 ( 2 ) 併用注意 ( 併用に注意すること )		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
チアジド系利尿剤 ( ヒドロクロロチアジド等 )	他の非ステロイド性消炎鎮痛剤とチアジド系利尿剤との併用により、チアジド系利尿剤の作用が減弱したとの報告がある。	省略 ( 変更なし )	チアジド系利尿薬 ( ヒドロクロロチアジド等 )	他の非ステロイド性消炎鎮痛剤とチアジド系利尿薬との併用により、チアジド系利尿薬の作用が減弱したとの報告がある。	省略
フロセミド	省略 ( 変更なし )		フロセミド	省略	
カリウム保持性利尿剤 ( スピロノラクトン等 )	本剤との併用により、降圧作用の減弱、腎機能障害患者における重度の高カリウム血症が発現するおそれがある。	本剤の腎におけるプロスタグランジン生合成阻害によるためと考えられる。	ACE 阻害剤 アンジオテンシン II 受容体拮抗剤	省略	省略
エプレレノン					
ACE 阻害剤 アンジオテンシン II 受容体拮抗剤	省略 ( 変更なし )	省略 ( 変更なし )			

使用上の注意に関するお問合せは下記までお願い致します。

ニプロジェネファ株式会社 安全管理グループ

TEL : 048-754-8716、FAX : 048-754-8776、E-mail : pms@nipro-genepha.co.jp